


Tests répétitifs dans les entreprises

Ensemble contre le coronavirus -

Protéger ensemble la famille, les amis et les collègues

① Qui ?



Aucun symptôme



Des symptômes ?

Ne participez pas à des tests répétitifs. Veuillez faire un test individuel directement dans un centre de test ou dans une pharmacie.


② Quoi ?

Test PCR poolé

Test antigénique rapide

③ Comment ?


1h avant :



Salive

Suivre les instructions, par exemple:


- 1) mettre une solution saline dans la bouche
- 2) agiter le liquide dans la bouche pendant 60 secondes.
- 3) cracher dans la cuve
- 4) mâcher et cracher encore une fois
- 5) bien fermer la cuve



Échantillonnage par un professionnel


Nasopharynx

Pooling par des personnes formées:



L'échantillon de salive est mélangé à d'autres échantillons en dehors du laboratoire d'analyse et est analysé en laboratoire. L'échantillon n'est pas traçable en fonction d'un individu.

Évaluation par un spécialiste:



Sur place, au cabinet du médecin, en pharmacie ou en laboratoire.

④ Résultat - et maintenant ?

Pool positif



Pool négatif



Test PCR unique dans un centre de test ou une pharmacie

Accorder encore l'attention aux règles d'hygiène et de comportement. Aucun contact privé.

Accorder encore l'attention aux règles d'hygiène et de comportement

Positif

Négatif



Isolation

Accorder encore l'attention aux règles d'hygiène et de comportement

Positif

Négatif



Isolation

Accorder encore l'attention aux règles d'hygiène et de comportement